

# Samanburður á svepprótarmyndun hjá skógarfuru og birki

Edda Sigurdís Oddsdóttir




## Nýskógrækt á Íslandi

- Eyðing skóga og jarðvegseyðing
- Þekja skóga fór úr ca 25% í 1.5%
- Um það bil 5.5 milljón plantna gróðursettar árlega
  - Birki (*Betula pubescens*) ca. 1/3
  - Skógarfura lítið notuð
- Ógróin svæði
- Mikil afföll plantna
  - Skortur á næringarefnum
  - Frostlyfting
  - Ranabjöllur (*Otiorhynchus nodosus/arcticus*)




# Útræn svepprót (ECM)

- Samlífi milli svepps og plönturótar
  - Sveppur fær orku
  - Plantan fær næringarefni og vatn




<http://www.waldwissen.net>



Þverskurður af útrænni svepprót




Fura




Birki

Útræn svepprót á furu og birkirótum


SKÓGREAÐT RÍKISINS  
RANNSOKNASTODD SKÓGREAÐTAR  
ÞÓSULBA




## Örvistir




## Þróun svepprótar á furu




## Þróun svepprótar á furu




57





70



98



Birkjarðv.




147  
dagar


Viðmið

SKÓGRAEKT  
RIKISINS  
RANNSOKNASTODD SKÓGRAEKTAR  
MÓGLIÐA


## Þróun svepprótar á birki




57



70




98



147

dagar





Birkjarðv.



Viðmið

SKÓGRAEKT  
RIKISINS  
RANNSOKNASTODD SKÓGRAEKTAR  
MÓGLIÐA

## Þróun svepprotar á birki



Birkjarðv.





57

70

98

147


dagar





Viðmið







## Munur á meðalfjölda svepprotarenda milli furu (+) og birkis (-)





## Munur á meðalfjölda svepprotargerða milli birkis og furu










# Cortinarius



1 tegund

- *C. erythrinus*



## Svepprótartegundir

Fura

- *Suillus luteus* (furusveppur) ríkjandi
  - *Phialocephala fortinii* og/eða *Piceirhiza bicolorata* í litlu mæli


Birkj

- Asksveppir og *Hebeloma* tegundir ríkjandi
  - Meiri fjölbreytni en á furu




## Þyngd plöntu

Birki




Fura




## Þyngd róta

Birki



Fura



## Samantekt

- Fura virðist öflugri í myndun svepprótar en birki
  - Sérstaklega áberandi í uppblásnum jarðvegi
- Fleiri svepprótartegundir finnast á birki en furu
- Furan er öflugri í uppblásnum jarðvegi en birki
  - Svepprótarmyndun??

